

## ***Brunnera Steven* – pomněnkovec**

**Boraginaceae**

2 druhy rozšířené na Kavkaze a Sibiři

***Brunnera macrophylla* (Adams) I.M.Johnston – pomněnkovec velkolistý**  
(Syn.: *Anchusa myosotidoiflora* Lehm. Pl. Asperif. Nucif.)

**Původ:** Kavkaz

**Ekologie:** řídké háje v horských až subalpínských polohách; hemikryptofyt.

**Růstové a vzhledové charakteristiky:** Vytrvalá bylina se šupinovitým oddenkem. Lodyhy vzpřímené, nevětvené, 20 – 50 cm vysoké, řidce štětinaté. Přízemní, dlouze řapíkaté **listy** tvoří trsy. Čepel vejčitá, na bázi srdčitě vykrojená, hustě porostlá jemnými chloupky, protáhlá ve výraznou špičku. Lodyžní listy mnohem menší a v horní části lodyhy přisedlé. Vzdušné, závojovité **květenství** vyrůstá mírně nad listy, je tvořeno z několika stopkatých, řídkých vijanů. Koruna květu kolovitá, 3 – 4 mm velká, modrá, připomínající květ pomněnky. **Plodem** je tvrdka. Kvete v IV až V.





### Nejvýznamnější odrůdy:

<b>‘Betty Bowring’</b>	L sytě zelený, bez kresby	květ bílý	55 cm
<b>‘Dawson’s White’</b>	Smetané panašování přechází od okraje čepele do středu listu	květ modrý	45 cm
<b>‘Hadspen Team’</b>			
<b>‘Jack Frost’</b>	Stříbřitě panašovaný mezi jednotlivými segmenty žilnatiny		20-30 cm květ IV-V
<b>‘King Ransom’</b>	L stříbřitě zelený; od okraje čepele do středu se žlutozeleným panašováním	květ modrý	25-30 cm
<b>‘Langtrees’</b>			
<b>‘Looking Glass’</b>			
<b>‘Mr. Morse’</b>			
<b>‘Starry Eyes’</b>			
<b>‘Variegata’</b>			



**‘Variegata’**



**‘Jack Frost’**



**‘Dawson’s White’**



**‘Mr. Morse’**



**‘Hadspen Cream’**



**‘Looking Glass’**



**Pěstitelské vlastnosti a požadavky:** Poměnkovec je nenáročná, dlouhověká trvalka. Preferuje polostín, ale můžeme ji použít také do stínu nebo na plné slunce, za předpokladu že ji pěstujeme v chladnějším a vlhčím prostředí, ve vlhké, humózní půdě. Použití na plném slunci je možné pouze tehdy, když je půda nepřetržitě vlhká. Jako jedna z mála trvalek toleruje i suchý stín i když naň reaguje mírně povadlým listem. Po přísunu vody rychle regeneruje.

**Množení:** semenem, dělením trsů. Ve vhodných pěstebních podmínkách mírně vysemeňuje a šíří se do okolí.

**Použití v zahradní a krajinářské tvorbě:**


Brunnera je představitelem divoce rostoucí trvalky záhonového charakteru, nacházejícího uplatnění jak v intenzivně ošetřovaných záhonech, tak v přírodě podobných vegetačních prvcích. Je rostlinou stanovištního prostoru „Gehölz-Rand“ – GR<sub>2</sub> – „Okraj dřevinných porostů“ (Sieber 1990). Najde uplatnění všude tam, kde je přistínění a vlhko a to jak v soukromých zahradách, tak ve veřejné zeleni:

- [Podrosty dřevinných](#) vegetačních prvků
- Bylinné lemy porostů dřevin
- Náhrady trávníků – má velmi dobrou krycí schopnosti listů a brzy po výsadbě vytvoří zapojený porost. Při plošných výsadbách je vhodné ji sázet na spon cca 30 x 30 cm.
- Stinné intenzivně ošetřované záhony ve kterých je cenná pro své brzké kvetení na jaře. Vhodnými druhy ke kombinaci, kvetoucími přibližně ve stejnou dobu jsou např. *Doronicum orientale*, *Geum coccineum*, *Waldsteinia geoides* a jiné.



*Brunnera macrophylla* v přistínění pergoly popnuté *Wisteria sinensis* vytváří souvislý půdní pokryv (Anglie, Kedleston Hall)





Vzdušné, světle modré, závojovité květenství *Brunnera macrophylla* kontrastuje s velkým, tmavým, vrásčitým listem. Zatímco v době kvetení je rostlina v kompozici nositelem velmi jemné textury, po odkvetení svým velkým srdčitým listem spíše nositelem středně hrubé textury.

**Literatura a odkazy:**

Sieber, J.: Die Sichtung der Stauden. Teil 1. Geschichte und Beetstauden. Bonn: Förderungsgesellschaft Gaertenbau. 1990.