



NEW YORK  
BOTANICAL  
GARDEN

introdukce nativních  
taxonů rodu

*A. vitifolia* Lam.


*Anemone vitifolia* Lam.

Hollich! cat. N° 4895  
a!

Sp. bot. in "Repert. 1821."

(B. Hancock 1813. ex Hall. cat. fol. 186.)

Sp. bot. in Hollich! cat. N° 4895



NEW YORK BOTANICAL GARDEN



00353210

HERB. ARTUM.



## introdukce ve skupině *Eriocapitella* (*Eriocephalus* s.l.)

- listy v přízemních růžicích laločnaté až dlanitodílné, vyrůstají z dřevnatějších oddenků; květní stonky olistěné a bohatě větvené
- nažky hustě vlnatě ochmýřené
- skupina dle molekulárních dat těsně spjata s taxony sekce *Rivularidium*, s nimi velmi blízké vztahy ke koniklecům



***Anemone hupehensis* (LEMOINE) LEMOINE**

Přízemní listy pýřité, zpravidla třídlílné s nedělenými středními laloky, vyrůstají z větvených oddenků

Veliké květy v mnohokvětých cymosních květenstvích obvykle pětičetné (kulturní odrůdy též s více sepaly), růžové nebo bílé  
Horské travnaté svahy a břehy potoků z Yunnanu a Sichuanu po Taiwan, mezi 400-2600 m n.m., v kultivaci od r. 1908



***Anemone vitifolia* BUCH.HAM.ex DC.**

*Anemone elegans* DECNE., *Anemone matsudae* TAMURA

přízemní listy ze silných větvených oddenků, nedělené, ale hluboce laločnaté se zubatě vyřezávanými okraji, vespod sametově plstnaté; větvené květní stonky až metr vysoké  
květy zpravidla bílé, vně zeleně nebo růžově stínované a pýřité  
světlé lesy a travnaté svahy z Nepálu do Yunnanu a Sichuanu, do 2800 m n.m.



***Anemone japonica* THUNB.**

*Anemone scabiosa* LÉVEILLÉ & VANIOT

přízemní listy trojdílné, pýřité jen vespod po nervatuře  
květy 15-20 i vícečetné, s úzkými sepaly v purpurových odstínech, vně často zeleně stínované  
ze zahrad zplaňující taxon popsáný z Nagasaki (1695) a odtud r. 1844 introdukovan (R.Fortune); znám je ale též z Číny. Kulturní taxon odvozený nejspíše z předešlých druhů



***Anemone rivularis* BUCH.HAM.**

*Anemone saniculaefolia* LÉVEILLÉ, *Anemone barbulata* TURCZ.

až metr vysoká s přízemními listy pýřitými, trojdílnými, s ostře laločnatými segmenty

květy (zvláště u *A. barbulata*) drobnější, pětičetné až desetičetné, bílé, vně zpravidla růžové nebo purpurové a pýřité, v bohatých cymosních květenstvích

lesní okraje a mýtiny, louky a břehy potoků z Mongolska do hor Sundských ostrovů, v Himálaji až k 4800 m



## introdukce v podrodu *Anemone* (*Eriocephalus* s.l.)

- listy v přízemních růžicích dlanitolaločné až dlanitodílné, vyrůstají z hlíz nebo masitých oddenků; kvetoucí stonky zpravidla nevětvené
- nažky hustě vlnatě ochmýřené na cylindrickém květním lůžku
- více než sto druhů po celé severní polokouli, odtud do jihoamerických velehor, dle molekulárních dat blízké skupině *Anemonanthea*



***Anemone coronaria* (SM.) KUNTZE**

*Anemone coccinea* JORDAN, *Anemone ventreana* HANRY

sotva půl metru vysoká s oddenky zhlíznatělými; přízemní listy trojdílné s mnohačetně rozsečenými segmenty  
veliké soliterní květy s 5-6 petaly (vně pýřitými) v šarlatových, modrých, růžových, bílých i žlutavých odstínech, často vícebarvé, podpírané límečkem peřeně laločnatých listenů  
ze stepí evropského jihovýchodu uvedena do kultur r. ....



***Anemone decapetala* L.**

*Anemone helleborifolia* DC., *Anemone triternata* VAHL.

až půl metru vysoká s přízemními listy trojdílnými, klínovitě laločnatými  
květy nad věncem listotvarých braktejí soliterně anebo v chudých okolících, s 10-12 bílými nebo modravými, pýřitými petaly  
v jihoamerických horách při lesních okrajích do 1500 m výšky, pěstována od r. ....



***Anemone multifida* POIR.**

*Anemone commersoniana* RICH., *Anemone magellanica* HORT.

až půl metru vysoká s listy hluboce mnohačetně rozsečenými  
okolíky s nevelikými, zpravidla pětičetnými (vzácně až patnáctičetnými) květy s pýřitými plátky v purpurových, růžových, bělavých i zelenavých odstínech  
v travnatých tundrách nebo na vysokohorských sutích obou amerických subkontinentů



***Anemone silvestris* L.**

*Anemone alba* JUSS.

až půl metru vysoká, dlanitě trojdílné až pětídílné listy s laločnatými, hrubě pilovitými segmenty vyrůstají z kolmých, zpravidla bohatě větvených oddenků  
květy bílé, někdy purpurově naběhlé, zpravidla pětičetné (vzácně až s osmi petaly)  
lesostepi evropských nížin a pahorkatin (zřídka nad 1000 m n.m), odtud do hor mongolských a čínských (zde až k 3400 m !)