



introdukce nativních taxonů rodu

Isotype of: *Erigeron potosinus*
Standl.
Ref. Publ. Field Columbian Mus., Bot. Ser.
22(2): 127 (1940)
Missouri Botanical Garden (MO)



Type Specimen
HERB. M.B.G.

PLANTS OF MEXICO
STATE OF NUEVO LEON

Erigeron potosinus Standl. sp. nov.

Abundant on forest floor. F.c. white,
tinged with rose. Las Canoas, Municipio
de Galeana.

No. 2174

Collected for the ARNOLD ARBORETUM, HARVARD UNIVERSITY, the MISSOURI
BOTANICAL GARDEN and the UNIVERSITY OF MICHIGAN
by C. H. Mueller

July 16, 1935

Isotype of:
Aster conduplicatus E.S. Burgess in Small
 Ref. Fl. S.E. U.S. 1221, 1340 1903
 Missouri Botanical Garden (MO)

introdukce ve skupině *Stenactis*

rod s cirkumantarktickým rozšířením (na 240 druhů ponejvíce severoamerických) postavený na základě morfologických znaků už linnéovskými botaniky (úborny s víceřadými paprsky, nažky s jednořadým chmýrem ... ale *Stenactis* s chmýrem dvouřadým na nažkách zpod kvítků disku!)

spadá do severoamerické vývojové větve »aster«, blízký zlatobýlům rodu *Euthamia*



Erigeron speciosus (LINDL.) DC.

Erigeron macranthus NUTT., *Erigeron mesa-grande* HORT. PAREY

přes půl metru vysoký s listy zahrocenými, při bázi objímavými, měkce pýřitými nebo lysými
 veliké úborny v bohatých plochých chocholících, s paprsky mnohařadými, purpurovými nebo růžovými
 z tichomořského pobřeží amerického severozápadu



Erigeron glaucus KER-GAWL.

Erigeron maritimus NUTT., *Erigeron hispidus* NUTT.

dorůstá jen něco přes čtvrt metru výšky, často s větvenými nadzemními oddenky ukončenými listovými růžicemi
 listy žláznatě pýřité, sivozelené, tupě ukončené
 veliké úborny s poměrně krátkými, bledě purpurovými paprsky
 z písčiny dun a útesů kalifornského pobřeží



Erigeron annuus L.

Erigeron ramosus (WALT.) B.S.P.

až metr vysoký s listy celokrajnými i hrubě zubatými, pýřitými
 drobné úborny v řídkých květenstvích s paprsky šeríkově růžovými nebo bílými
 pobřežní křoviny a erozní břehy celého severoamerického kontinentu, dnes antropogenní plevel celosvětově rozšířený



Erigeron peregrinus GREENE

Erigeron callianthemus GREENE, *Erigeron thompsonii* BLAKE

přes půl metru vysoký s hustě olistěnými stonky, s listy při bázi objímavými, měkce pýřitými a při bázi objímavými
 veliké úborny v chudých květenstvích, s paprsky purpurovými nebo růžovými
 ze suchých horských svahů amerického jihozápadu

BILTMORE HERBARIUM.

Aster nova-belgi L.

No. 6358.

Moist soil near BILTMORE, BUNCOMBE COUNTY, NORTH CAROLINA.
 Determined by Dr. John K. Small. September 30th, 1897.

UNIVERSITY OF ILLINOIS HERBARIUM (ILL)

= *Aster novi-belgii* L. (or near)
 with indropression of *A. curvifolius*
 Det. Almut G. Jones 1980 T. & G.

UNIVERSITY OF ILLINOIS HERBARIUM
 DEPARTMENT OF BOTANY
 ISOTYPE of

Aster conduplicatus Burgess in Small,
 Fl. S.E. United States, 1212, 1340, 1903.

Det. Almut G. Jones 1981

MISSOURI BOTANICAL GARDEN