



**Množení, výsadba, ošetření porostů  
Řez květenství a posklizňové ošetření**





## MNOŽENÍ A VÝSADBA

odrůdy lze množit časně zjara (nejlépe již před vyrašením) dělením trsů »» vzhledem k dřevnatým oddenkům ve spleti kořenů jde o pracovně náročnou metodu množení

upravené odkopky lze vysazovat přímo, vhodnější však bývá dopěstování v 80 mm hrnkách s výsadbou na připravené záhony koncem května

nově jsou nejžádanější selekce pro velkovýrobní produkci množeny prostřednictvím tkáňových kultur



přes relativně vyšší variabilitu potomstva jsou výsevy vybraných odrůd dosud nejčastější metodou množení

**skarifikované osivo** (8 g pro tisíc rostlin) se vysévá do mulčiplat, dobře provlhčené výsevy umístíme do prostor s teplotami 16°C-18°C na dva až čtyři týdny

poté přemístíme výsevy do chladných prostor s teplotami do 2°C nejméně na čtyři - šest týdnů

po ošetření nízkými teplotami je možno výsevy přemístit do skleníků s teplotami 10°C-14°C

osm týdnů po vzejití lze přepichovat přímo do 8cm hrnků

Dopěstované rostliny lze vysazovat v počtu 440 rostlin pro ar (**0.4 x 0.4 m**) na záhony s vododržnými, slabě kyselými (pH 6.4-7.0) půdami s vysokým obsahem organických látek, kultury kvetou druhým rokem po výsadbě.

## DALŠÍ OŠETŘOVÁNÍ POROSTŮ

V předjaří každoročně rozhození plného hnojiva (6-8 kg na ar), v půli léta další 4 kg s důrazem na fosforečno-draselnou složku: především u červeně kvetoucích odrůd se za vyššího obsahu dusíku brakteoly špatně vybarvují a klesá trvanlivost květenství.



## ŘEZ KVĚTENSTVÍ A POSKLIZŇOVÉ OŠETŘENÍ

Stonky je nutno řezat v době, kdy jsou ve většině květenství plně vybarvené a rozvinuté brakteoly a otvírají se první květy; v níže postavených okolicích může být plně nakvetlá třetina (nejvýše však dvě třetiny) květů.

Příliš brzy řezaná květenství se nerozvíjejí a vadnou, opožděný řez zkracuje trvanlivost produktu.

Trvanlivost květučích stonků ve vodě asi 6-8 dní; po ošetření kvarterními amoniiovými solemi nejvýše 8-10 dní.

Květenství možno sušit v silikagelu nebo boraxu (asi 6 dní).