

A close-up photograph of a plant, likely a species of squash or pumpkin, showing several green, deeply lobed leaves with serrated margins. The leaves are attached to a thick, dark brown, textured stem. The background is black, making the plant stand out. The lighting is bright, highlighting the texture of the leaves and the stem.

**Množení, výsadba,
ošetření porostů a
řez květenství**



MNOŽENÍ A VÝSADBA

odrůdy lze množit dělením trsů zjara před rašením

produktivnější je odběr apikálních výhonů, jejichž vývin je podporován hlubokým seříznutím trsů po odkvětu ⇒ po 2-3 týdnech z hlíznatějších oddenků prorážejí výhonky

výběžky se odebírají co nejmenší, vzápětí jsou pak vyvíjeny nové

do podzimu lze dopěstovat silné, výsadby schopné rostliny



pro výsev bývá běžně nabízeno osivo odrůd 'Magnificum', 'Finesse', 'Little Leo' (poslední pro hrnkové kultury)

5 g osiva postačí k dopěstování tisíce rostlin

Klíčí při 10°C-14°C do 14-20 dní

Po čtyřech týdnech lze přepichovat přímo do 6-8cm hrnků

Dopěstované rostliny lze vysazovat ve sponu **0.3 x 0.3 m** do čtyřech řádků na záhonu, do výživných a vododržných, slabě kyselých (pH 6.4-7.0) a organickými látkami bohatých půd doplněných dle možnosti rašelinou a předhnojených 10 kg NPK pro ar. Vzrůstnější odrůdy (např. 'Excelsum') ve vzdálenosti 0.3 m do řádků o rozteči 0.6 m.

DALŠÍ OŠETŘOVÁNÍ POROSTŮ

Každoročně ve dvou dávkách (v březnu a v červenci nebo srpnu) rozhození plného hnojiva (4-6 kg na ar), v době květní tvorby a vývinu úborů je nutno udržovat vlhko, také v létě za sucha jsou nutné závlahy. V oblastech bez sněhu bývá užitečná lehká pokrývka slámou. Po druhém roce je vhodné rostliny zmladit a založit nové porosty: především *D. plantagineum* a *D. austriacum* bývají krátkověké.

Výnosy se pohybují u *D. orientale* při 10-12 stoncích v prvním a při 6-8 kvetoucích stoncích z rostliny ve druhém roce, u *D. plantagineum* při 20-30 stoncích v prvním a zhruba při patnácti stoncích ve druhém roce kultivace.

MOŽNOSTI PŘIRYCHLENÍ

V dobře větratelných foliových tunelech nebo pařeništích je kvetení možno přirychlit až o dva týdny - pod folií zůstávají rostliny až do řezu květenství, teplotu je však vhodné držet pod 14°C-16°C. U vyšších odrůd ('Excelsum', 'Goldstrauss', 'Harpur Crewe') bývá přínosná instalace drátěných opor kolem záhonů.



ŘEZ KVĚTENSTVÍ A POSKLIZŇOVÉ OŠETŘENÍ

úborny je nejlépe řezat po plném rozvití paprsků v době, kdy nejsou otevřeny více než 2-3 řady kvítků disku

trvanlivost se pohybuje:

mezi 3-5 dny u *D. orientale*

mezi 4-7 dny u *D. plantagineum*

některé přípravky k prodloužení trvanlivosti květů (Nelken-chrysal) květenství kamzičníků poškozuji!