



**Použití v zahradní
a krajinářské tvorbě**

Rod *Achillea* nachází v zahradní a krajinářské tvorbě široké uplatnění. To se výrazně liší u skupiny nízkých a vysokých řeбриčků. Ve skupině nízkých řeбриčků se nejčastěji pěstují a používají druhy *A. serbica*, *A. ageratifolia* a *A. tomentosa*. Jsou nenáročné na pěstování, vyžadují jen slunná stanoviště a kamenitou, štěrkovitou a dobře propustnou půdou. Uplatní se proto ve skalkách, na suchých zídkách, ve společenstvech stylizující kamenité stepi apod. Zřídka se můžeme setkat s dalšími, podobně používanými druhy jako jsou *A. clavenae*, *A. umbellata*.

Další pěstované a používané druhy patří do skupiny středně vysokých a vysokých trvalek:



Achillea filipendulina je záhonová trvalka s tuhou, vzpřímenou, spoře větvenou lodyhou a atraktivním, nejčastěji sytě žlutým květenstvím. Odrůdy (často hybridy s *A. clypeolata*) se liší ve výšce i barvě. 'Parker' a 'Golden Plate' dosahují až 1.2 m, 'Coronation Gold' a 'Altgold' pouze 0.6 - 0.8 m a patří k nejběžnějším sytě žlutým odrůdám. Výrazným zpestřením v sortimentu jsou novější hybridy s červenými ('Feuerland', 'Walther Funcke'), citrónově žlutými ('Credo', 'Zitronengold') nebo smetanově bílými květy ('Küstennebel'). Patří k cenným trvalkám plného léta kvetoucím od června do srpna.

(1) *Achillea filipendulina* 'Coronation Gold'

(2) *Achillea filipendulina* 'Coronation Gold' a *Salvia nemorosa* 'Vesuv'

Nejdůležitějším použitím jsou výsadby v různých typech trvalkových záhonů. *Achillea filipendulina* patří k dlouhověkým trvalkám. Vysoké odrůdy je vhodné na záhonech vyvazovat k oporám nebo vzpřímený vzrůst zajistit pomocí kovových skruží. V intenzivně ošetřovaných záhonech je nutné po odkvetení v létě odstranit odkvetlá květenství.



Naopak v extenzivně ošetřovaných záhonech, k jakým patří výsadby typu *Silbersommer*, ponecháme působit tvrdé struktury rostlin až do jara, kde je spolu s dalšími rostlinami seřezeme krovinořezem.



Na záhonech tvoří vysoké odrůdy výrazné dominanty, které používáme soliterně nebo v menších skupinách. Sázíme je 3 - 5 ks /m², nižší odrůdy je možné vysazovat i na větších plochách v počtu 5 - 7 ks/m².

Achillea filipendulina 'Golden Plate'
pěstovaná pro sušení



Achillea millefolium je trvalka planě rostoucí se záhonovým charakterem, vitální a agresivní rostlina schopná intenzivně se šířit do okolí oddenky. Lze ji použít jako pionýrskou bylinu ve směsích s dalšími dvouděložnými rostlinami (*Hieracium aurantiacum*, *Medicago lupulina*, *Silene nutans*, *Verbena officinalis*, *Tithymalus cyparissias* a jiné) k osetí svahů, hald, výsypek atd. Nachází uplatnění také v květnatých trávnících na živných vápenatých, suchých až vlhkých hlinitých půdách nebo na chudých, suchých, kyselých a písčitých půdách, rovněž při zakládání slunných bylinných lemů přírodě podobného charakteru.

Achillea millefolium 'Colorado'

Odrůdová nabídka je velmi široká a postihuje téměř celou barevnou škálu vyjma modrých a zelených odstínů. Odrůdy jsou zpravidla méně expanzivní a mohou být proto použity spolu s dalšími trvalkami na záhonech v menších či větších skupinách. Vhodnými druhy pro kombinaci jsou např. *Salvia nemorosa*, *Coreopsis verticillata*, *C. grandiflora*, *Rudbeckia fulgida*, *Agastache foeniculum* atd. Na 1/m² vysazujeme přibližně 7 až 10 rostlin.

Achillea ptarmica je rovněž divoce rostoucí trvalkou se záhonovým charakterem. Čistý botanický druh, u nás domácí, osídluje vlhké, mokré rašelinné louky v potočních a říčních nivách, stanoviště na březích řek, potoků a rybníků. Druhotně obsazuje ruderalní plochy jako jsou příkopy, nesečené plochy podél plotů. V zahradní a krajinářské tvorbě ho můžeme využít při zakládání “přírodě podobných” vegetačních prvků na vlhkých až mokřých, neutrálních až mírně kyselých půdách nejčastěji v kombinaci s vodou. Pro léčivé účinky je pěstována od středověku a v současnosti nachází uplatnění v selských a vesnických zahrádkách. Většina pěstovaných odrůd (např. ‘Ballerina’, ‘The Pearl’, ‘Schneeball’) se od botanického druhu liší poloplným až plným květem a menší vitalitou, která v konečném důsledku znamená menší expanzivitu. Odrůdy lze použít do záhonů s vlhkou půdou, na výsadby k vodě – bez přímého kontaktu s vodou), na sušení. Upřednostňuje slunná stanoviště ale je tolerantní i k menšímu přistínění. Ve výsadbách ji lze kombinovat např. s druhy *Aconitum napelus*, *Alchemilla mollis*, *Geranium palustre*, *Iris sibirica*, *Lythrum salicaria* atd. Vysazujeme v podobné hustotě jako *A. millefolium*.

