



**Množení, výsadba, ošetření porostů**





## MNOŽENÍ A VÝSADBA

odrůdy lze množit časně zjara (nejlépe již před vyrašením) dělením trsů; doporučováno bývá též zimní množení

upravené jarní odkopky lze vysazovat přímo, vhodnější bývá ale dopěstování ve 12 cm hrnkách s výsadbou na připravené záhony v květnu

u dvoudomé *A. dahurica* FRANCH. vybíráme pro vegetativní množení hodnotnější samčí rostliny



čerstvé osivo (ploštičníky 5 g, samorostlíky až 25 g pro tisíc rostlin) vyséváme do truhlíků, provlhčené výsevy umístíme do prostor s teplotami 18°C-22°C asi na šest týdnů

poté přemístíme výsevy do chladných prostor s teplotami do 2°C (lépe až -4°C) nejméně na šest až osm týdnů

**nízkými teplotami nedostatečně ošetřené osivo přeléhá!**

po ošetření nízkými teplotami je možno výsevy přemístit do skleníků s teplotami do 10°C, pomalu lze teploty zvedat

deset týdnů po vzejití lze přepichovat přímo do 8cm hrnků

Dopěstované rostliny lze vysazovat v počtu 210 rostlin pro ar (**0.8 x 0.6 m**) na záhony s nevysýchavými, slabě kyselými (pH 6.4-7.0) půdami s vysokým obsahem organických látek, kultury kvetou druhým rokem po výsadbě. Nezbytná je instalace závlah.

## DALŠÍ OŠETŘOVÁNÍ POROSTŮ

V předjaří každoročně rozhození plného hnojiva (10 kg na ar), v půli léta dalších 8 kg nebo lépe hnojení organické; půdu je nutno udržovat vlhkou. Odkvetlé stonky nezažítovat víc než na třetinu délky (především u *Actaea* s.str. s absencí bazálních listů!) Výsadby jsou produkceschopné 6-8 let, poté je nutno porosty obnovit přemnožením.



## ŘEZ KVĚTENSTVÍ A POSKLIZŇOVÉ OŠETŘENÍ

stonky je nutno řezat v době, kdy je zhruba čtvrtina až třetina kvítků v centrálním hroznu nakvetlá

u druhů skupiny *Actaea* (s.str.) jsou pro řez vhodné především stonky se zralými bobulemi

trvanlivost ve správné zralosti řezaného květenství do čtyř až šesti dnů; stonky s dozralými bobulemi až čtyřikrát déle